



Leicht vereinfachte räumliche Darstellung der durch die Grabung Untermaßfeld aufgeschlossenen Schichtglieder (Stand Ende 1995). – 1 Jüngere Zersatzgrobschotter (JZ Grobsch.). – 2 Auesediment (A Sed). – 3 Untere Fluviatile Sande (UF Sd). – 4 Sandiger Schluff in Unteren Fluviatilen Sanden. – 5 Hellgraubraune Fein- und Mittelsande in Schrägschichtung. – 6 Muschelkalkschutt in Unteren Fluviatilen Sanden. – 7 Obere Fluviatile Sande, unterer Teil (OF Sd (u)). – 8 Gelbbrote Mittelsandeinschaltung in Oberen Fluviatilen Sanden. – 9 Muschelkalkschutt in Oberen Fluviatilen Sanden. – 10 Hangschuttfächer (HS Fä). – 11 »Schluffband«. – 12 Obere Fluviatile Sande, oberer Teil (OF Sd (o)). – 13 Schluffig-tonige Rinnenfüllung. – 14 Deckschichten (D Sch). – 15 Großgeröll in Deckschichten. – (Entwurf: R.-D. Kahlke, Reinzeichnung: N. Fiebig).

ANLAGE I

zu: R.-D. Kahlke, Verbesserte geologische Standardprofile zur unterpleistozänen Komplexfundstelle Untermaßfeld. In: R.-D. Kahlke, Das Pleistozän von Untermaßfeld bei Meiningen (Thüringen). Teil 2. Röm.-Germ. Zentralmus. Mainz, Monogr. 40,2 (2001), S. 433ff.